



ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Informe Semanal | 30 de Mayo de 2019



Secretaría de Agroindustria
Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación


INFORME SEMANAL al 30 de Mayo 2019

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 30/05/19
 - Cosecha Fina, Campaña 2019/20 (Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 2018/19 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Avance de la cosecha de maíz.
- ✓ Avance de la cosecha de maní.
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo.
- ✓ Avance de la cosecha de soja.
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2008/2009 - 2017/2018
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2008/2009 - 2017/2018
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2017/2018
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (soja)
- ✓ Mapa de delegaciones

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011- 4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar

PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos siete días se concentraron en el NEA. Los máximos semanales corresponden a Bernardo de Irigoyen (127mm), Corrientes (98,2mm) y Resistencia (98mm). En el resto de la zona los acumulados rondaron los 30mm. En el resto del país no se superaron los 10mm, excepto en Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz, donde se dieron lluvias de 30-40mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana

Se esperan pocos acumulados en el país. Entre jueves y sábado se esperan precipitaciones en el NEA, algunas caídas ocasionales de lluvia en provincias del centro como Buenos Aires, Córdoba, sur de Santa Fe y La Pampa. Además durante el mismo período, se podrían dar acumulados aislados en la Patagonia.

TEMPERATURAS

Las temperaturas medias de los últimos siete días fueron inferiores a las normales en el NOA y en Cuyo, mientras que se mantuvieron dentro del rango normal para la época del año en el resto del país. Se registraron heladas meteorológicas en la totalidad de Patagonia, región cordillerana, zonas serranas de San Luis y Córdoba, sur de Buenos Aires e incluso en la región núcleo pampeano. Las heladas agronómicas alcanzaron a cubrir todo el territorio nacional, a excepción del NEA. Las marcas térmicas extremas de la semana corresponden a Andalagá (30,4°C) y Maquinchao (-11,4°C).




Anomalía de la temperatura media de la semana

Se esperan temperaturas levemente por debajo de lo normal en la mayor parte del país. Para el resto de la semana, se espera que las temperaturas tengan leves aumentos entre jueves y miércoles de la próxima semana, pudiendo darse condiciones de heladas agronómicas en el sur de la provincia de Buenos Aires, principalmente en zonas serranas, entre sábado y lunes.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

Los mapas corresponden a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para pradera implantada o campo natural, según corresponda a cada región. Valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php. La escasez de precipitaciones de las últimas semanas continúa permitiendo el retroceso de los excesos hídricos en la mayor parte del país. Solo en el NEA de dieron lluvias importantes que se reflejan en los perfiles muy recargados que se observan en Corrientes, Chaco, y sectores de Formosa y Entre Ríos. En Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, este de Buenos Aires y noroeste de La Pampa predominan ampliamente los polígonos con reservas hídricas adecuadas, con algunos sectores donde son óptimas o regulares. En el sudoeste de Buenos Aires, continúan dándose condiciones deficitarias, con probabilidad de mantenerse así, teniendo en cuenta el pronóstico de precipitaciones para la próxima semana.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y del INTA e información de suelos del INTA

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS AL 30/05/2019

COSECHA FINA – CAMPAÑA 2019/2020

TRIGO

Córdoba

En la provincia de Córdoba, en áreas de las delegaciones Laboulaye, y Marcos Juárez, se registra un avance de siembra promedio del 17% favorecida por la buena humedad en el perfil. De todas maneras muchos productores esperan a principios de junio para iniciar la implantación y así llegar mejor a la etapa de floración respecto al período de riesgo de heladas y también a que se seque el terreno que en algunos sectores presenta excesiva humedad. Los lotes ya emergidos se observan en buenas condiciones y los más adelantados ya presentan 2 a 3 hojas. En algunos se observa presencia de pulgón. En general, la tecnología usada es muy buena.

En la delegación Río Cuarto se estima un avance de siembra del 30% con ciclos largos e intermedios largos. No se observan inconvenientes.

Entre Ríos

En la zona de la delegación Rosario del Tala, continuó la siembra de algunos lotes de manera aislada con cultivares de ciclos largos, en tanto que otros productores esperan que mejoren las condiciones de los suelos para iniciarla. Se estima un avance de alrededor del 1,5%, sobre una intención del área a sembrarse, que rondaría las 310.000 ha, un 5% más con respecto a la campaña anterior. A medida que finalice la recolección de lotes de soja y las condiciones de los pisos lo permitan, la implantación se intensificará dado que, para la zona, nos encontramos en fecha ideal.

La Pampa

Se iniciaron los trabajos de siembra de variedades de ciclo largo en algunos sectores de la delegación General Pico, ubicados en la zona centro sur de la región, favorecidos por el óptimo contenido de humedad del suelo. En idéntica fecha de la campaña anterior los trabajos de siembra aún no se habían iniciado.

Santa Fe

En la delegación Casilda, han comenzado las labores de implantación del cultivo, en lotes aislados de los departamentos Caseros y San Lorenzo. El resto del área espera por una mejoría en la aptitud de los suelos ya que buena parte de la superficie registra un tenor de humedad excesivo. Así mismo, se siguen realizando los controles de malezas y en algunas zonas aguardan el arribo de heladas dada la alta densidad de soja guacha por pérdidas de cosecha. Las variedades sembradas son las de ciclo largo, estimándose una actividad mayor para los próximos días si se cumple el pronóstico de ausencia de precipitaciones. Los niveles de inclusión tecnológica son los habituales para la zona, no observándose variaciones en las estrategias de fertilización.

También se informa el comienzo de la siembra en las delegaciones Rafaela, Cañada de Gómez y Venado Tuerto, con excelentes condiciones de humedad en el perfil para poder lograr una muy buena implantación.

NOA

Se inició la siembra en las provincias de Salta y Jujuy con buenas perspectivas y buen contenido de humedad en el perfil del suelo.

En Tucumán y Catamarca, sigue avanzando la siembra de trigo en los lotes liberados por la soja. Se estima que se sembrará más que el año pasado, debido a que los suelos disponen actualmente de bastante humedad.

COSECHA GRUESA – CAMPAÑA 2018/2019

ALGODÓN

En la provincia de Salta, continúa avanzando la cosecha, estimándose la misma a la fecha, en un 28% del total implantado.

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa avanzando a medida que las condiciones de humedad y piso lo permiten, presentando importantes mermas en calidad.

MAÍZ

Buenos Aires

En la zona de la delegación Lincoln la cosecha se encuentra transitando las etapas finales, habiéndose alcanzado a la fecha una trilla del 95%. Los rindes superan las expectativas, ya que la provisión hídrica durante etapas críticas, fue satisfecha. Se reportan rendimientos promedios de 104 qq/ha, para la zona.

En la zona de la delegación Pehuajó, se continua avanzando en la cosecha, sin inconvenientes, favorecida por la baja humedad ambiental.

En Pigüé, el exceso de humedad en grano no permite avanzar con rapidez en la cosecha del cultivo.

En aéreas de la delegación Saliqueló, continúa la recolección del maíz obteniendo un avance del 88%, los rendimientos se mantienen en 76 qq/ha. Los lotes que se sembraron más tardíos dieron inicio a su cosecha, los rindes se mantienen por sobre las expectativas iniciales.

Para la zona de Tandil, es muy poco el avance de la cosecha, dado que se prioriza finalizar con la soja y a que el contenido de humedad del grano aún es alto. Los rendimientos obtenidos hasta ahora son buenos.

Córdoba

En la zona de la delegación Laboulaye, el avance de la cosecha alcanza al 77% de la superficie implantada, restando muy pocos lotes que alcanzaron ya su madurez comercial.

En Marcos Juárez se complica el avance de la cosecha por el tiempo húmedo y las lloviznas. Incluso para sacar los camiones del campo. Se estima un 87% el grado de avance en la trilla, con rendimientos que se mantienen estables y altos. En la zona centro los promedios están en los 110 - 115 qq/ha, en la zona sur los rindes promedian 105 qq/ha y el norte en los 85 qq/ha, la zona oeste promedia los 95-100 qq/ha. Los lotes de segunda y tardíos están en buenas condiciones, en etapa madurez. No obstante no se comenzarán a cosechar hasta 30 días o más. Se esperan rindes de 80 - 90 qq/ha promedio.

Chaco

El cultivo de maíz en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se desarrolla en etapas reproductivas de formación y llenado de grano, y si bien las condiciones de humedad son muy buenas, la baja insolación podría afectar el rendimiento final.

Entre Ríos

En la zona de la delegación Paraná, se encuentra terminada la cosecha de los lotes de primera, con rindes obtenidos por encima de la media zonal, concluyendo en un muy buen año para el cultivo. Los lotes de segunda y tardíos evolucionan generalmente en buenas condiciones, transitando las últimas etapas de desarrollo próximos a cosecharse.

En la delegación Rosario del Tala, los lotes que quedan por cosecharse son los tardíos y de segunda, no habiéndose dado comienzo con su cosecha, dado a que los productores aún no han finalizado con la recolección de lotes de soja y se encuentran a la espera de mejoras en las condiciones climáticas para que baje la humedad de los granos. En cuanto a los rendimientos esperados para estos lotes, se posicionarían entre los 45 a 75 qq/ha (promediando entre los 60 a 65 qq/ha)

La Pampa

En la delegación General Pico, los trabajos de cosecha se desarrollan con normalidad y buen ritmo. La finalización de la recolección de soja podría acelerar los trabajos de cosecha. Se estima que el rango de rendimientos de mayor frecuencia de maíces tardíos oscila entre 70 y 100 qq/ha y que el valor de rendimiento promedio total sería próximo a los 90 qq/ha, un valor considerado récord histórico para la zona norte de La Pampa. El avance de los trabajos de cosecha sería levemente superior al 70% de la superficie total estimada del cultivo. En idéntica fecha de la campaña anterior el avance de los trabajos de cosechas fue del 60%.

En la zona de la delegación Santa Rosa, el avance en las tareas de cosecha es leve, y no muestra porcentajes significativos.

Santa Fe

En áreas de la delegación Cañada de Gómez, los maíces de segunda o tardíos se encuentran al final de su ciclo ontogénico aguardando para ser cosechados.

En la zona de la delegación Casilda, las lluvias de la semana pasada y el clima húmedo que persistió luego de dicho fenómeno, no permiten que el cultivo avance en la pérdida de humedad de granos imprescindible para su recolección. Los lotes se observan senescentes en su área foliar, sin plantas quebradas o volcadas pero con espigas húmedas que postergan el inicio de la cosecha. Se estima que, de registrarse buen tiempo, en un lapso no menor a 15 días se daría comienzo a la trilla de los primeros lotes.

En la zona de la delegación Rafaela los lotes tardíos o de segunda evolucionan con buenas condiciones de crecimiento y desarrollo, beneficiados por lluvias importantes recibidas durante el ciclo. Actualmente la mayoría de los lotes avanzan en etapa de madurez fisiológica, con buen estado sanitario.

En Venado Tuerto continúa la cosecha de las siembras más tardías con bajo ritmo.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, con excepción de la delegación Lincoln, que ya se encuentra cercano a finalizar la cosecha, (con rendimientos promedios de 34.5 qq/ha), las restantes delegaciones donde se encuentra implantado el cultivo (Pehuajó, Salliqueló), el avance promedia el 20% de lo sembrado, con rendimientos que van de normales a buenos para la zona.

En la zona de la delegación Laboulaye, se continuó con la trilla de los cuadros que se encontraban arrancados y se sumaron otros que en días más se trillarán definitivamente.

En Marcos Juárez, lo que se recolectó hasta el momento, presenta excelente promedios que superan 35 – 40 qq/ha. Hay temor por que se mantenga el mal clima y afecte la calidad, como también el rinde.

En la zona del NOA se ha dado por finalizada la cosecha, con un importante porcentaje de perdidas, debido a la elevada humedad que presentaban los granos.

POROTO

En la región del NOA, se estima dar inicio a la cosecha durante los próximos días, en tanto que el cultivo presenta buen aspecto general, sin inconvenientes de relevancia.

SOJA

Buenos Aires

En la zona de la delegación Lincoln aún restan unos pocos lotes de soja de primera para dar por finalizada la cosecha. Los rines promedios sorprendieron en la zona, y se reportan valores cercanos a los 36.4 qq/ha. En tanto que para la soja de segunda, el avance en la cosecha representa el 93.5% del total implantado, con rendimientos promedio de 24.6 qq/ha.

En la zona de la delegación Pehuajó, la ausencia de precipitaciones y la baja humedad ambiental, permiten el avance en las tareas de cosecha, sin inconvenientes.

En ámbitos de la delegación Pigüé, continua con normalidad la cosecha, aunque dados los pronósticos de precipitaciones para los próximos días, se estima que la trilla pueda demorarse.

En la delegación Salliqueló, la cosecha en soja alcanza el 90% en los partidos del sur de la delegación, mientras que en los partidos de Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas el avance logra un 85% del área total sembrada. Se estima que en los próximos días daría fin a la misma. En cuanto a los rendimientos de los lotes tempranos los mismos alcanzaron un promedio de 31 qq/ha, en cuanto a los cuadros más tardíos rondan los 27 qq/ha.

En áreas de la delegación Tandil, concluyó la cosecha de soja de primera, con rindes superiores a los de la campaña pasada. Un promedio que ronda los 26 a 27 qq/ha, con picos por encima de los 35 qq/ha. Respecto a la soja de segunda, luego de las lluvias generalizadas del 18 de mayo, avanza la cosecha, con rendimientos muy dispares. Incluso, lotes que no se cosechan por tener menos de 5 qq/ha.

Córdoba

En la zona de la delegación Laboulaye ha finalizado la campaña al trillarse los últimos lotes de soja de segunda y tardíos, que aún se mantenían en pie, para una cosecha que arrojó un par de puntos por encima de los rindes del ciclo anterior.

En Marcos Juárez, ha finalizado la cosecha de los lotes restantes. Los lotes finales salían con 1 y 2 puntos de humedad, los rendimientos se mantuvieron elevados y constantes. Los rindes son muy buenos con promedios cercanos a los 37 qq/ha, con picos de 50 qq/ha y lotes muy afectados por excesos de lluvias o napa, que rindieron 15 - 20 qq/ha.

Entre Ríos

En Paraná, para las sojas de primera, prácticamente terminadas las tareas de cosecha en la jurisdicción de la delegación. Las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de maquinarias han permitido un rápido avance durante los últimos días. Los rindes obtenidos son variables, pero la mayoría se ubican entre buenos y muy buenos. Respecto a las sojas de segunda, la cosecha ha alcanzado el 80% de avance durante la presente semana. Los rendimientos obtenidos son variables, debido a la existencia de lotes que se vieron afectados durante la siembra y primeras etapas de desarrollo por excesos de lluvias.

En Rosario del Tala, otra semana en donde, si bien los productores intensificaron las trillas, hasta últimas horas de la tarde del sábado, estos vieron disminuidos las horas de cosecha, por las condiciones climáticas imperantes a partir del domingo. El avance de cosecha para lotes de primera, es de alrededor del 94%, con rindes promedio que se posicionan cercanos a los 30,5 qq/ha. En lo que respecta a lotes de segunda, el avance de su cosecha se ubica alrededor del 72%, los últimos lotes recolectados poseen una humedad en los granos próxima al 16%, los rendimientos se ubican alrededor de los 22 a 23 qq/ha.

La Pampa

En la zona de la delegación General Pico se dan por finalizados los trabajos de recolección de lotes de primera y se estima que el valor de rendimiento promedio total sería próximo a los 36 qq/ha, un valor considerado récord histórico para la zona norte de La Pampa. En idéntica fecha de la campaña anterior el avance de los trabajos de cosechas era del 90%. Con respecto a los cultivos de segunda, prácticamente el total de la superficie sembrada ha ingresado o transcurre la etapa de plena madurez y se estima un avance de cosecha próximo al 40% de la superficie total sembrada con muy buenos rendimientos, con valores que oscilan entre 25 y 32 qq/ha.

En ámbitos de la delegación Santa Rosa, continúa la cosecha de este cultivo. Se estima un avance general en la zona del 90%. Los rindes no varían desde pisos de 22 qq/ha hasta techos de 38 qq/ha, siempre hablando de las de primera. Con respecto a las de segunda con un avance del 50%, tampoco se reportan variaciones en rindes, que van entre 9 a 18 qq/ha.

San Luis

La cosecha de soja está muy avanzada y en soja de primera ya se encuentra en las etapas finales de la cosecha. En tanto para las sojas de segunda, el avance se sitúa en un 93% de área trillada.

Santa Fe

En Cañada de Gómez vuelve a detenerse la cosecha de este cultivo, debido a las condiciones climáticas imperantes. Los rendimientos promedio hasta el momento son de 38 qq/ha. Se estima que dadas las persistentes condiciones de humedad por lluvias y lloviznas, haya una caída en la calidad del grano.

En Rafaela, continúan lentamente las labores de cosecha de los últimos lotes pendientes de primera y de segunda, condicionadas por el clima muy húmedo con días nublados que se registran en la presente semana. Con buenas condiciones climáticas se estima la finalización de la trilla en los próximos días. Se obtienen rendimientos variables para las sojas de primera y segunda, con promedios

zonales que se ubican entre 28 y 43 qq/ha, siendo buena la calidad comercial de los granos cosechados hasta el momento.

Chaco

La cosecha del cultivo en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña también presenta las complicaciones generadas por las condiciones de elevada humedad y falta de piso con pérdidas de calidad que llegan hasta el 50% en algunos casos.

NOA

En la provincia de Jujuy, se han registrado algunas precipitaciones, que aunque si bien se continúa avanzando en la cosecha, se han informado algunas pérdidas por esta situación.

En tanto que en las provincias de Salta y Tucumán, no se han registrado precipitaciones, y se pudo continuar con las labores de cosecha. En Salta se estima que en unos pocos días, se dará por finalizada la trilla, mientras que en Tucumán, algo más demorado, y con un ritmo más lento, la finalización se dará un poco más tarde.

SORGO

En la delegación Pehuajó, se levantaron los escasos lotes sembrados, con un rinde promedio de 68 qq/ha. En el resto de la provincia de Buenos Aires prosiguieron las tareas de cosecha a excepción de la zona de Tandil. A nivel provincial se informa un avance del 60% del área implantada, cuando para la misma fecha el año pasado iba por un 47%.

En Marcos Juárez, se estima un avance de cosecha del 87%, y los rindes promedian los 48 - 50 qq/ha.

En la delegación Rosario del Tala, se recolectaron muy pocos lotes en esta semana, debido a que los productores priorizan la cosecha de soja y a que disminuya la humedad de los granos lo más cercano a la base. El rinde promedio se ubica en los 52 qq/ha.

En la provincia de Santa Fe, en la zona de la delegación Rafaela, continuó muy lentamente la cosecha de los últimos lotes tardíos que aún quedan en pie. Los rendimientos son muy dispares según zonas, los que oscilan entre 30 y 50 qq/ha.

MAPA DE DELEGACIONES

